

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se han publicado numerosos estudios que describen la distribución geográfica de la mortalidad en áreas pequeñas. La mayoría de estos mapas son estáticos, estudian un único periodo de tiempo que agrupa información de varios años y utilizan razones de mortalidad estandarizadas. Esta metodología no siempre es adecuada, especialmente cuando se analizan indicadores de salud que cambian con el tiempo. El Atlas Interactivo de Mortalidad en Andalucía (AIMA) surgió como una alternativa que permite describir la evolución de las principales causas de muerte en los municipios andaluces desde una perspectiva dinámica.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es mostrar la evolución espacio-temporal de la mortalidad general en los municipios de Andalucía desde 1981 hasta 2005 utilizando la información registrada en AIMA.


MÉTODOS

Diseño: Ecológico, utilizando el municipio como unidad de análisis territorial.
Variable dependiente: Número de muertes en cada municipio para cada año, sexo y grupo de edad (menor de 1 año, 1-14, 15-44, 45-64, 65-74 y 75-84)
Análisis estadístico: El suavizado de estas tasas, así como la estimación de la razón de tasas específicas de mortalidad con respecto a España, se realizó utilizando modelos jerárquicos bayesianos espacio-temporales.

RESULTADOS

Tendencia de las tasas específicas de mortalidad en los municipios de Andalucía, 1981-2005

Más del **95%** de los municipios andaluces presenta una tendencia de mortalidad **decreciente o estable** en todos los grupos de edad y sexo.



Comparativa de la tasa de mortalidad de cada municipio con España

Desde 1981 se observó una tendencia **convergente** de las tasas municipales y españolas. En 2005, más del **95% de municipios** presentó una tasa de mortalidad inferior o similar a la de España en los grupos de edad **menores de 65 años**. Desde 1981, **Andalucía occidental** presenta una tasa de mortalidad superior a la de España en los grupos de **edad mayores de 65 años**.

2005 - Hombres

2005 - Mujeres

15-44 años

45-64 años

15-44 años

45-64 años

65-74 años

75-84 años

65-74 años

75-84 años

■ Tasa superior a la española
■ Diferencias no significativas
■ Tasa inferior a la española

CONCLUSIONES

La tasa de mortalidad general de los municipios andaluces ha disminuido considerablemente entre los años 1981 y 2005, observándose una tendencia convergente con la tasa española. El estudio ofrece una imagen dinámica de la mortalidad desde los años previos a la reforma sanitaria hasta la actualidad. Su análisis contribuirá a la reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la salud en Andalucía.